



Baqsimi[®]

glucagon nasal powder 3 mg



将BAQSIMI保存在热缩包装管内，使用时取出。

用于低血糖紧急情况

使用 **BAQSIMI**

如果您患有糖尿病，且正在服用胰岛素，那么您可以为低血糖紧急情况准备应急预案（严重低血糖）。

了解更多关于低血糖紧急情况和 **BAQSIMI**。

BAQSIMI[®] 是一种用于治疗严重低血糖的药物。这种情况也被称为严重低血糖反应。主要针对服用胰岛素治疗糖尿病的成年人和4岁及以上的儿童。当一个人无法摄入糖时可使用该产品。

低血糖紧急情况随时随地都有可能发生

比如,当您少吃一餐、健身过度、饮食摄入量不足以平衡所服用的胰岛素,甚至在夜晚入睡时,都有可能发生这种情况。

BAQSIMI 是一种干燥鼻粉剂,您周边的人可在您处于低血糖紧急情况下使用。

什么是 BAQSIMI?

- BAQSIMI 是一种经鼻用胰高血糖素粉末剂。

 配方发明源自加拿大

- 与注射用胰高血糖素不同的是,BAQSIMI 不需要混合或称量,可以随时使用。
- BAQSIMI 无需吸入。
- **BAQSIMI** 可在患者低血糖、无法进食,甚至昏迷状态下使用。
- 如果您感冒了或正在服用感冒药,您也可以使用 **BAQSIMI**。
- BAQSIMI 无需冷藏保存。最高储存温度可达 30°C (86°F)。
- 使用前请勿拆封热缩包装。

何时使用 BAQSIMI?

- 当您处于低血糖紧急情况,且无法进食,需要其他人协助时,可使用 BAQSIMI。
- 让您周围的人了解低血糖的可能症状尤为重要,这样他们便可随时提供帮助。
- 告诉您的家人、朋友或同事 BAQSIMI 的存放位置,并解释它的使用方法。在您有需要之前,他们需要了解如何使用 BAQSIMI。
- 每次使用 BAQSIMI 后,请通知您的医生。您的医生可能需要调整您的糖尿病药物剂量。

可能的低血糖症状包括:



情绪波动



头晕



思考与说话困难



颤抖或出汗



身体不协调



抽搐或失去知觉

如何使用 BAQSIMI?

使用前请阅读 BAQSIMI 患者用药信息。

告诉您的家人、朋友或同事 BAQSIMI 的存放位置，并解释它的使用方法。
在您有需要之前，他们需要了解如何使用 BAQSIMI。

使用前请勿拆封热缩包装

- 使用前请勿测试装置，因为每个包装中仅含有一剂胰高血糖素，且仅可使用一次
- BAQSIMI 只可经鼻用


准备步骤：

- 撕拉红色条带以拆封热缩包装
- 打开瓶盖，将装置从管中取出
- 使用前请勿测试


注意：在准备好用药之前，请勿按压柱塞

给药：


- 用食指中指和拇指配合夹住装置
- 在将喷头插入鼻腔前，请勿推动柱塞。否则，将会浪费装置内唯一的一剂药物



- 将装置的喷头轻轻插入一侧鼻孔，直至手指触碰到鼻子的外侧



- 将柱塞完全推入
直到柱塞上的绿线完全看不见时，说明给药已完成



将 BAQSIMI 保存在热缩包装管内，使用时取出。如果管被拆封，BAQSIMI 有可能受潮。这会导致它无法正常使用。

 访问BAQSIMI.ca官网，观看如何正确使用

使用前请保证管处于密封状态。


Baqsimi[®]
glucagon nasal powder 3 mg

给药后：

取出喷头，并将使用过的装置与管子扔掉。

立即寻求医疗帮助。

如果低血糖患者昏迷不醒，请翻转其身体。

如果患者出现了严重的 BAQSIMI 过敏反应，请立即前往就医，例如出现：

- 皮疹
- 呼吸困难
- 面部肿胀，包括嘴唇、舌头、喉咙肿胀

患者通常在15分钟内出现反应。鼓励患者在能够安全吞咽的情况下尽快进食。给患者补充快速升糖食物，如果汁或普通的苏打水。然后给患者服用长效升糖食物，如饼干、奶酪或含肉三明治。

注意：请立即更换使用过的BAQSIMI，这样可以保证您拥有一个全新的BAQSIMI以防万一。

BAQSIMI 基本说明

- ! 使用前请保证管处于密封状态。BAQSIMI一旦受潮，可能无法正常使用
- 每支 BAQSIMI 装置内含一剂（3毫克）胰高血糖素鼻用粉末，且仅可使用一次
- BAQSIMI 只可经鼻用
- BAQSIMI 在过保质期后不可使用
- 请记得告诉身边的人您存放 BAQSIMI 的位置

随身携带 **BAQSIMI**，并在您常到的场所备用 - 比如家中、单位或学校

请记得阅读您的 **BAQSIMI** 处方说明。更多详细信息，请访问 **BAQSIMI.ca** 官网



Baqsimi[®]
glucagon nasal powder 3 mg

一起了解 BAQ!

访问 [BAQSIMI.ca](https://baqsimi.ca) 官网, 获取更多有用的工具与资源



学习如何使用 BAQSIMI

观看该视频, 教您如何使用 BAQSIMI



到期提醒

在 [BAQSIMI.ca](https://baqsimi.ca) 官网上设置到期提醒, 当您的 BAQSIMI 即将到期时, 它会自动通知您



工具和资源

下载有用的 BAQSIMI 工具和资源



常见问题

有任何疑问? 查询常见问题!



点击或 扫描以上二维码进入 [BAQSIMI.ca](https://baqsimi.ca) 官网

在您的手机锁屏上添加您的医疗 ID

对于 iPhones 用户

1. 在您的手机上打开“健康应用”(Health app)
2. 点击“医疗ID选项卡”, 然后点击“编辑”
3. 输入您希望人们在紧急情况下获悉的医疗信息
4. 滑动屏幕顶部的“锁定时显示”切换按钮, 使其变为绿色
5. 点击“完成”

对于 Android 用户

1. 打开应用程序设置
2. 点击“关于手机”, 然后点击“紧急信息”
 - a. 如果您未找到“紧急信息”, 返回并点击“用户和账户”, 然后点击“紧急信息”
3. 输入您希望人们在紧急情况下获悉的医疗信息
4. 点击“保存”

现在, 只需将锁定屏幕向上滑动, 并点击“紧急情况”, 即可轻松访问您的医疗信息。



Baqsimi[®]
glucagon nasal powder 3 mg



严重警告与预防:

BAQSIMI 只能在无法吞咽糖（如糖果或橙汁）的情况下使用。BAQSIMI 给药后，请立即寻求医疗帮助。BAQSIMI 给药后，患者通常在15分钟内出现反应。等待医疗救助；他们可能需要通过静脉给患者注射葡萄糖（静脉注射）。在患者出现反应后，尽快让他们在安全的地方进食。

如果肝脏中的葡萄糖储备不足，那么 BAQSIMI 也无济于事。在这种情况下，必须通过静脉注射补充葡萄糖。如果患者有以下情形，那么上述情况可能发生；

- 长时间未进食
- 患有抑制肾上腺分泌足够激素的疾病（又称肾上腺机能不全）
- 慢性低血糖

什么人不建议使用 BAQSIMI?

- 对胰高血糖素或 BAQSIMI 其他成分过敏者
- 嗜铬细胞瘤患者，即肾脏顶部的一个或两个腺体（肾上腺）患有肿瘤
- 胰腺肿瘤（又称为胰岛瘤）患者

BAQSIMI 可能的副作用有哪些？

在您使用 BAQSIMI 后，这些并非可能出现的全部副作用。如果您出现了任何未列出的副作用，请联系您的医护专业人员。

- 恶心、呕吐、腹痛或不适
- 上呼吸道刺激，包括打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、流鼻血或不适感、咳嗽、喉咙痛
- 头痛、虚弱、疲劳、嗜睡
- 眼睛流泪、发红或发痒
- 耳部、面部或颈部疼痛
- 味觉或嗅觉改变
- 注意力不集中、困惑、焦虑
- 皮肤发痒、排汗增加
- 心率增加、血压上升

如果出现以下副作用，请停止使用 **BAQSIMI**，并立即前往就医：

过敏反应（过敏症状）：喘息或呼吸或吞咽困难。出汗、皮疹、荨麻疹、面部以及嘴唇、舌头、喉咙肿胀。心跳加速、晕倒或低血压。



Baqsimi®

胰高血糖素鼻粉剂 3毫克

严重低血糖？经鼻喷入！



配方发明源自加拿大

BAQSIMI® 商标由礼来公司 (Eli Lilly and Company) 及其子公司或关联公司拥有或许可。

PP-GN-CA-001/C © Lilly LLC 2020. 保留所有权利。